

## *Lloydia serotina* L.

Loïdie tardive

### Description

Plante vivace de 5-15 cm., glabrescente, à bulbe à peine renflé, oblong, revêtu d'une longue tunique grisâtre ; feuilles filiformes, les radicales 2-3, dressées, égalant ou dépassant la tige très grêle, les caulinaires 3-4 très courtes ; fleur petite, blanche striée de rose, jaunâtre à la base, solitaire, dressée ; périanthe marcescent, à 6 divisions libres, étalées, oblongues, égales, munies à la base d'une petite fossette nectatifère ; 6 étamines, plus courtes que le périanthe, à filets filiformes ; anthères dressées, fixées par la base creuse ; style court, à stigmate obtus ; capsule dressée, subglobuleuse-trigone ; graines petites, triangulaires-comprimées.

### Répartition

Pelouses des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. Europe ; Asie ; Amérique boréale.

### Noms communs

FR : Lloydie tardive, Loïdie tardive

GB : Snowdon Lily, Snowdown Lily

### Synonymes

**Taxonomiques** : *Ornithogalum striatum* Sweet, *Ornithogalum altaicum* W.Rossi & Minut., *Nectarobothrium redowskianum* Cronquist, *Lloydia alpina* Dumort., *Bulbocodium autumnale* L.

**Nomenclaturaux** : *Rhabdocrinum serotinum* L., *Phalangium serotinum* L., *Nectarobothrium striatum* Sweet, *Gagea serotina* L., *Cronyxium serotinum* L., *Bulbocodium serotinum* L., *Anthericum serotinum* L.

### Informations complémentaires

**Chorologie** : arctico-alpin

**Inflorescence** : fleur solitaire terminale

**Sexualité** : hermaphrodite

**Ordre de maturation** : protandre

**Pollinisation** : entomogame

**Fruit** : capsule

**Dissémination** : barochore

**Couleur fleur** : blanc

**Macule** : rose

**Floraison** : juin-août

**Type biologique** : géophytes à bulbe

**Formation végétale** : hémicryptophytaie

**Caractérisation écologique** : parois européennes, acidophiles, subalpines-alpines, ligures

### Syntaxon

Saxifragion pedemontanae subsp. pedemontanae Barbero & Bono 1967




### Classification

Règne : Plantae

Famille : Liliaceae

Genre : *Lloydia*



### Légende

- Zone géographique non renseignée
- Présent
- Présence à confirmer
- Disparu ou douteux
- Cité par erreur comme présent
- Présence non signalée

### Correspondances

**Flora Helvetica** : *Lloydia serotina* L.

**Flore du CNRS** : *Lloydia alpina* Dumort.

**Coste** : *Lloydia serotina* L.

**Bdnff** : *Lloydia serotina* L.

### Codes informatiques

**Nomenclatural** : [BDNFFnn39569](#)

**Taxonomique** : [BDNFFnt6336](#)

## ***Lloydia serotina* L. (suite)**

Loïdie tardive

### **Autres noms communs**

**IT** : Falangio alpino

**NL** : Laatbloeiende Looydia

**DE** : Spätblühende Faltenlilie

### **Liens**

**Nomenclature** : <http://www.tela-botanica.org/nn39569>

**Taxon** : <http://www.tela-botanica.org/nt6336>

### **Données bibliographiques :**

P. F. - **Petites monographies biologiques - 26. - *Lloydia serotina* (L.) Rchb. (N° 742 des Quatre Flores de la France) - 1936 - N°222** - Saisie : Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul - Art. n°1890